Rosioara

Vass4R09s496-500




Collection Vassal-Montpellier

0Mtp986


Madridand No. 200

Rosioara 4 R9 s 496-500









N° d'ordre : Désignation : 4 R90-496,5000-1

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/8 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 96

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Rosionna (...) 4 R98-496.500

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies (252) - vert 253,

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge fonce 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue.

Bourgeon : colore 264 - vert 265

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

7737

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année: 1998

Code clone

Code cépage : Nom cépage : Kostoura

Observateur: Lacombe

Emplacement: 4 Rgs486. 500

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7)- très grande 9

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4) - réniforme 5

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 > sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen(5)- vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle 1 - point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe: nulle 1 - point pétiolaire rouge 2)- rouge jusque première bifurcation 3)- rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente 1 - présente 9)

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente 1 - présente 9.

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté(3)- révoluté 4 - tourmenté(5)

oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte (7)très forte 9

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 -

moyenne 5- forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 -

moyenne(5)- forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3)moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte (7)- très forte 9.

oiv 087* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présenté ①

oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente T)- présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5- forte 7 - très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal/5)plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré 176.

Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année : 1998

198

Observateur : Lacombe

Code cépage :

Code clone :

Nom cépage: Rosioara

Emplacement: 4 Rs sug6 500

Grappe

oiv 202 **longueur**: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 très compacte 9.

oiv 206 **longueur pédoncule**: très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7

oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4

Baie

oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 3 - longue

(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.

oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) (5)- large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9.

oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3)

oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 - cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2)

oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne forte très forte 9.

oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne(5)- épaisse 7 - très épaisse 9.

oiv 229 ombilic : peu apparent 1)- apparent 2.

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée 1) colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée ① - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - forte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.

oiv 236 saveur : aucune 1) - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5

oiv 236* saveur : aucune (1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5- long

(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3)

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 6-7

oiv 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes (1)- présentes 2.

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année

Code clone

Observateur

Code cépage

Nom cépage : Rosioara

Emplacement: 4 Rg s 496-500

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1) - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unic 1 - côtelée 2 - striée 3)

oiv 103 couleur générale : jaune (1)- brunâtre (2)- rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 9 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence) - présence 9

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence 1) présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand

(14mm)(7)- très grand (>17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3

viguem 4